УДК 663.263

**К РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЯ
ОЦЕНКИ РОЗЛИВОСТОЙКОСТИ
ВИНОГРАДНЫХ ВИН ПРИ
ОБРАБОТКЕ МОНТМОРИЛЛОНИТОМ**

Агеева Наталья Михайловна
д-р техн. наук, профессор

*Государственное научное учреждение
Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводства
и виноградарства Россельхозакадемии,
Краснодар, Россия*

Дунец Роман Валерьевич
канд. техн. наук, доцент

*Кубанский государственный
технологический университет,
Краснодар, Россия*

Проведена статистическая обработка
результатов исследований с целью
обоснования объективного критерия
оценки стабильности виноградных вин.
Получены уравнения регрессии.

Ключевые слова: МОНТМОРИЛЛОНИТ,
СТАБИЛЬНОСТЬ, ПОЛИСАХАРИДЫ,
БЕЛКИ, БИОПОЛИМЕРЫ ВИНА

UDC 663.263

**TO DEVELOPMENT OF
EVALUATION CRITERION OF WINE
STABILITY WITH PROCESSING
OF MONTMORILLONITE**

Ageeva Natalia
Dr. Sci. Tech., Professor

*State Scientific Organization North
Caucasian Regional Research Institute
of Horticulture and Viticulture
of the Russian Academy of Agricultural
Sciences, Krasnodar, Russia*

Dunets Roman
Cand. Tech. Sci., Docent

*Kuban State Technological University,
Krasnodar, Russia*

Statistical processing of researching
results for substantiation of the objective
criterion of evolution of wines stability is
conducted. The equations of the regression
are obtained.

Key words: MONTMORILLONITE,
STABILITY, POLYSACCHARIDES,
PROTEINS, WINE BIOPOLYMERS

Введение. Одной из важнейших проблем качества винодельческой продукции является обеспечение ее устойчивости против помутнений коллоидной природы. Обычно для установления склонности или устойчивости вин к этому виду помутнений используется комплекс тестов, основанных на провоцировании образования осадков с помощью химических реагентов (например, танины) или изменением температурных условий (охлаждение или нагревание). Однако практика показывает, что зачастую вина, выдержавшие тесты в лабораторных условиях, мутнеют или при транспортировании, или через 2-3 месяца с момента розлива.

Таким образом, существующие методы тестирования не позволяют получить объективную информацию о розливостойкости вина. На наш

взгляд, для разработки объективных методологических подходов к оценке розливостойкости виноградных вин необходимо создание базы данных с последующей статистической обработкой экспериментального материала. При этом основу базы данных должны составлять данные не только о концентрациях отдельных компонентов, влияющих на устойчивость вин к помутнениям коллоидной природы (белки, фенольные соединения, полисахариды, катионы металлов), но и о суммарной концентрации биополимеров, а также о соотношениях отдельных компонентов в комплексе биополимеров.

Цель настоящей работы – разработка объективных критериев оценки розливостойкости виноградных вин на основе статистической обработки экспериментальных материалов исследований комплекса высокомолекулярных соединений вина.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований использовали белые столовые виноматериалы Рислинг и Ркацители, а также ликерные вина, приготовленные по различным технологическим схемам. Для обработки виноматериалов применяли природный и активированный диоксидом серы махарадзевский монтмориллонит.

Состав биополимеров виноградного виноматериала – белков (Б), фенольных веществ (ФВ) и полисахаридов (П), а также их соотношений в комплексе биополимеров – определили по методике [1]. Определение продолжительности стабильности вина – путем длительного хранения проб до нарушения их товарного вида.

Обсуждение результатов. Столовые сухие и ликерные белые виноматериалы были обработаны природным (ПМ) и активированным монтмориллонитом (АМ) (дозировка 2 г/дм³). Результаты изменения состава биополимеров до и после обработки приведены в табл. 1.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что применение природной и активированной форм монтмориллонитов оказывает неодина-

ковое влияние на концентрацию высокомолекулярных соединений в обработанных виноматериалах и на их соотношение в комплексе биополимеров. Проведённые эксперименты показали, что в необработанном виноматериале Рислинг, приготовленном из самотечной фракции, преобладал белок – полисахаридный комплекс (табл. 1). В остальных вариантах – белок – полифенол-полисахаридный комплекс с большей долей полисахаридов.

Высокое содержание полисахаридов, проявляющих «защитное» действие по отношению к другим коллоидам вина, позволяет считать их одной из основных причин образования труднообрабатываемых вин. Анализ данных количественного и качественного состава биополимеров, ответственных за формирование коллоидных помутнений, показал, что ПМ и АМ по-разному влияют на концентрацию и соотношение компонентов в комплексе биополимеров. При применении АМ для обработки натуральных сухих вин наблюдалось большее в сравнении с ПМ снижение количества всех исследуемых групп высокомолекулярных соединений, особенно полисахаридов, в результате чего происходило закономерное изменение их соотношения.

Несколько иная картина выявлена для всех вин специальных технологий. По-прежнему АМ сорбировал большее количество высокомолекулярных соединений, чем ПМ (см. табл. 1). Однако соотношение между компонентами в составе комплекса биополимеров изменилось незначительно [2].

Характерно, что после обработки виноматериалов различных типов бентонитами АМ и ПМ в составе комплекса биополимеров по-прежнему преобладали полисахариды, противодействовавшие более полному удалению белков и фенольных соединений бентонитами обеих форм. Высокая концентрация фенольных веществ, особенно в винах специальных технологий, позволяет прогнозировать возможное протекание реакций их окисления с последующей полимеризацией и конденсацией, что может стать причиной нарушения стабильности вина.

Таблица 1 – Влияние обработки виноматериалов природным и активированным монтмориллонитом на состав биополимеров, мг/дм³

Виноматериал	До обработки					После обработки									
	Б	ФВ	П	Б:ФВ:П	Ста- бильн., мес.	ПМ					АМ				
						Б	ФВ	П	Б:ФВ:П	Ста- бильн., мес.	Б	ФВ	П	Б:ФВ:П	Ста- бильн., мес.
<i>Белые столовые сухие</i>															
1. Рислинг:															
- из самотёка	12,4	13,6	64,4	1:1,1:5,2	1	2,6	8,4	48,2	1:3,2:18,5	4	1,4	4,0	28,6	1:2,9:20,4	12
- смеси само- тёка и сусла 1-го давления	16,2	26,1	88,7	1:1,6:5,5	0,8	3,6	16,2	46,4	1:4,5:12,9	3	2,1	12,6	18,0	1:6,0:8,8	10
2. Ркацителли:															
- из самотёка	12,8	36,2	92,1	1:2,8:7,2	2	2,8	10,4	14,6	1:3,7:5,2	6	1,6	8,8	6,9	1:5,5:4,3	14
- из смеси фракций	26,4	46,2	101,7	1:1,8:3,9	1	2,3	18,2	24,4	1:7,9:10,6	5	1,9	6,6	6,4	1:3,5:3,4	12
<i>Вина ликерные (белые)</i>															
3. Из сусла-само- тёка и 1-го дав- ления	8,6	24,4	70,8	1:2,8:8,2	2	3,5	8,8	24,2	1:2,5:6,9	6	2,0	6,0	14,6	1:3,0:7,3	8
4. Из смеси фракций	14,2	48,6	94,6	1:3,4:6,7	0,5	4,6	21,8	47,3	1:4,7:10,3	6	2,6	12,4	31,6	1:4,8:12,2	7
5. Из смеси прес- совых фракций	16,4	78,2	118,6	1:4,8:7,3	0	2,6	31,5	67,2	1:12,1:25,9	4	2,0	18,2	40,7	1:9,1:20,4	7

Таким образом, материалы проведенных нами исследований, представленные в настоящей работе, позволяют считать бентонит монтмориллонит, активированный диоксидом серы, надёжным средством регулирования количества биополимеров с целью профилактики и устранения коллоидных помутнений виноградных вин [3].

Расчётная стабильность виноматериалов Y (месяцев), в зависимости от изменения состава биополимеров до и после обработки природным и активированным монтмориллонитом приведена в табл. 2.

В уравнениях регрессии участвуют факторы: B – содержание белка, $ФВ$ – фенольных веществ, $П$ – полисахаридов в натуральной размерности мг/дм³ и в долях от единицы (например, содержание белка, фенольных веществ и полисахаридов в исходном виноматериале будет равно 1 и при обработках, как правило, уменьшается). Коэффициент корреляции в каждом из уравнений был равен 1.

Можно отметить, что в натуральном выражении факторов в уравнении регрессии участвует произведение фенольных веществ ($ФВ$) и полисахаридов ($П$), а также произведение всех биополимеров (белки, полисахариды, фенольные вещества). Нулевой коэффициент численно означает предельно допустимую для этого вида виноматериала стойкость, при концентрации биополимеров, стремящейся к нулю.

Усреднение коэффициентов уравнений для одного виноматериала, но из различных фракций даёт хорошо сходимые результаты, что подтверждено уравнением регрессии для ликерного белого вина в долях единицы (табл. 3, 4).

На рисунке представлены материалы исследований, свидетельствующие о существовании корреляционной связи между суммой биополимеров (деленной на 3) и стойкостью исследуемых сухих столовых вин к помутнениям. Показано, что соотношение высокомолекулярных веществ в комплексе биополимеров должно изменяться от 0,2 до 0,4.

Таблица 2 – Расчётная стабильность виноматериалов

Виноматериал	Расчётная стабильность виноматериалов у, месяцев
<i>Столовые сухие</i>	
Рислинг из самотёка	в натуральном выражении: $y = 15,37884 - 0,0312 \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П} + 0,001193 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
	в долях единицы: $y = 19,48841 - 26,1951 \cdot \text{ФВ} + 7,706704 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
Рислинг из смеси самотёка и сусла 1-го давления	в натуральном выражении: $y = 13,3474 - 0,01615 \cdot \text{ФВ} \cdot \text{ПС} + 0,000662 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
	в долях единицы: $y = 14,61224 - 23,6768 \cdot \text{П} + 9,864512 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
Ркацители из самотёка	в натуральном выражении: $y = 20,41676 - 0,11999 \cdot \text{ФВ} \cdot \text{ПС} + 0,008942 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
	в долях единицы: $y = 26,22335 - 95,2185 \cdot \text{Б} + 70,99515 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
Ркацители из смеси фракций	в натуральном выражении: $y = 12,74739 - 0,01887 \cdot \text{ФВ} \cdot \text{ПС} + 0,00062 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
	в долях единицы: $y = 15,971111 - 28,4216 \cdot \text{ФВ} + 13,45048 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
<i>Вина ликерные (белые)</i>	
Из сусла- самотёка и 1-го давления	в натуральном выражении: $y = 10,02072 - 0,02865 \cdot \text{ФВ} \cdot \text{ПС} + 0,002792 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
	в долях единицы: $y = 10,669 - 11,767 \cdot \text{Б} + 3,098007 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
Из смеси фракций	в натуральном выражении: $y = 7,61542 - 0,00158 \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П} + 0,00000198 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
	в долях единицы: $y = 8,157254 - 4,2485 \cdot \text{ФВ} - 3,40876 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
Из смеси прессовых фракций	в натуральном выражении: $y = 8,678046 - 0,00245 \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П} + 0,0000923 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$
	в долях единицы: $y = 11,48883 - 13,2511 \cdot \text{П} + 1,762255 \cdot \text{Б} \cdot \text{ФВ} \cdot \text{П}$

Таблица 3 – Расчёт средних значений уравнения регрессии для
ликерного белого вина, в долях единицы

Коэффициент	Во	ФВ	Б	П	БхФВхП
Численные значения	10,669	0	-11,767	0	3,098007
	8,157254	-4,2485	0	0	-3,40876
	11,48883	0	0	-13,2511	1,762255
Средние значения	10,10503	-1,41617	-3,92234	-4,41703	0,483835

Таблица 4 – Расчётные значения стойкости для ликерного белого вина
(в долях единицы)

Усреднённое уравнение регрессии: $y = 10,10503 - 1,41617 \cdot \Phi В - 3,92234 \cdot Б - 4,41703 \cdot П + 0,483835 \cdot Б \cdot П \cdot \Phi В$	Фактическая стойкость, месяцев	Расчётная стойкость, месяцев
		2
	6	6,969094
	8	8,405108
	0,5	0,833325
	6	6,487925
	7	8,05702
	0	0,833325
	4	6,877116
	7	8,290675

Рис. Изменение стабильности сухих вин в зависимости от суммы долей биополимеров, делённой на три

Заключение. Таким образом, представленные материалы исследований показали, что, зная концентрации высокомолекулярных соединений в вино материале и используя полученное уравнение регрессии, можно заранее прогнозировать продолжительность устойчивости обрабатываемых вино материалов к помутнениям коллоидной природы.

Литература

1. Агеева, Н.М. Физико-химические и биотехнологические основы повышения качества и устойчивости вин к помутнениям: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.01 / Агеева Наталья Михайловна. – Краснодар, 2001. – 50 с.
2. Гержилова, В.Г. Биотехнологические основы повышения качества столовых и шампанских вино материалов: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.18.19 / Гержилова Виктория Григорьевна. – Ялта, 1997. – 47 с.
3. Агеева, Н.М. Стабилизация виноградных вин: теоретические аспекты и практические рекомендации. – Краснодар: ГНУ СКЗНИИСиВ, 2007. – 251 с.